

1. $x^2 - 7x + 1 = \left(x - \frac{7}{2}\right)^2 - \left(\frac{7}{2}\right)^2 + 1 = \left(x - \frac{7}{2}\right)^2 - \frac{45}{4}.$

2. $|x - 6| > 9 \Leftrightarrow x < -3 \text{ eller } x > 15.$

3. Linjens ekvation blir: $y - 1 = \frac{3 - 1}{-2 - (-3)} \cdot (x - (-3)) \Leftrightarrow y = 2x + 7.$

4. $\frac{3^{2x}}{3^3} = 81 \Leftrightarrow 3^{2x} = 3^4 \Leftrightarrow 3^{2x} = 3^7 \Leftrightarrow 2x = 7 \Leftrightarrow x = \frac{7}{2}.$

5. $\sqrt{20} - \sqrt{5} + \sqrt{2} + \sqrt{8} - \sqrt{18} = 2\sqrt{5} - \sqrt{5} + \sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = \sqrt{5}.$

6. Vi löser ut b ur ekvationen $a \cdot (b - f) - f \cdot b = 0 \Leftrightarrow ab - af - fb = 0 \Leftrightarrow ab - fb = af$

$$b(a - f) = af \Leftrightarrow b = \frac{af}{a - f}$$

Vi sätter in $a = 18$ och $f = 6$ och får $b = \frac{18 \cdot 6}{18 - 6} = \frac{18 \cdot 6}{12} = \frac{18}{2} = 9$

7. Kvoten är $x^2 + 4x + 2$ och resten är $-2x + 3$.

8. $\sin 2x + 2 \cos x = 0 \Leftrightarrow 2 \cos x \sin x + 2 \cos x = 0 \Leftrightarrow 2 \cos x (\sin x + 1) = 0.$

Vi får två ekvationer:

1) $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}.$

2) $1 + \sin x = 0 \Leftrightarrow \sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + n2\pi, n \in \mathbb{Z}.$

Den lösningen finns redan i $x = \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}$ (överlappning)

Svar: $x = \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}$

9. Enligt trigonometriska ettan har vi $\cos^2 v = 1 - \sin^2 v = 1 - \left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^2 = \frac{5}{6} \Leftrightarrow \cos v = \pm \sqrt{\frac{5}{6}}.$

$$\Leftrightarrow \cos v = \pm \sqrt{\frac{5}{6}} \quad \text{och} \quad \cos 2v = \cos^2 v - \sin^2 v = \left(\sqrt{\frac{5}{6}}\right)^2 - \left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^2 = \frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{2}{3}.$$

10. $\sqrt{x-1} \cdot \sqrt{x+3} = x$. Kvadreringen ger $(x-1)(x+3) = x^2 \Leftrightarrow$

$x^2 + 2x - 3 = x^2 \Leftrightarrow 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$. En kontroll ger att bara $x = \frac{3}{2}$ är en lösning.

Svar: $x = \frac{3}{2}$.

11. $e^{\ln 2} + \ln 32 - \ln 4 + \ln 8 - 4 \ln 2 - \lg 100 = 2 + \ln 2^5 - \ln 2^2 + \ln 2^3 - 4 \ln 2 - 2 = .$
 $= 5 \ln 2 - 2 \ln 2 + 3 \ln 2 - 4 \ln 2 = 2 \ln 2.$

12.
$$\begin{aligned} & \frac{\left(\frac{x-y^2}{x}\right)^2}{(y+x)^2} \cdot \frac{x}{x-y} = \left(\frac{x^2-y^2}{x}\right)^2 \cdot \frac{1}{(y+x)^2} \cdot \frac{x}{x-y} = \frac{(x^2-y^2)^2}{x^2} \cdot \frac{1}{(y+x)^2} \cdot \frac{x}{x-y} = \\ & = \frac{(y+x)^2(x-y)^2}{x^2} \cdot \frac{1}{(y+x)^2} \cdot \frac{x}{x-y} = \frac{x-y}{x}. \end{aligned}$$

13. $2 \sin x = \sqrt{2} \Leftrightarrow \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + n2\pi \text{ eller } x = \pi - \frac{\pi}{4} + n2\pi = \frac{3\pi}{4} + n2\pi, n \in \mathbb{Z}.$

Svar: $x = \frac{\pi}{4} + n2\pi$ eller $x = \frac{3\pi}{4} + n2\pi, n \in \mathbb{Z}$

14. $\frac{5-2i}{(1-i)^2} = \frac{5-2i}{1-2i+i^2} = \frac{5-2i}{-2i} = \frac{(5-2i) \cdot i}{-2i \cdot i} = \frac{2+5i}{2} = 1 + \frac{5}{2}i.$

15. $|z-i| \leq 2$ är en cirkelskiva med MP: $(0,1)$ och radien $\sqrt{2}$.

16. $2 \lg(x-4) = \lg x + \lg 2 \Rightarrow \lg(x-4)^2 = \lg 2x$

Vi får $(x-4)^2 = 2x \Leftrightarrow x^2 - 8x + 16 = 2x \Leftrightarrow x^2 - 10x + 16 = 0 \Leftrightarrow$

$x = 2, 8$. En kontroll ger att $x = 2$ är en falsk rot.

Svar: $x = 8$.

17. $\frac{5}{x+1} - \frac{3x-12}{x^2-1} = 1, \quad x \neq \pm 1.$ Gör liknämligt

$$\begin{aligned} & \frac{5(x-1)-(3x-12)}{x^2-1} = 1 \Leftrightarrow \frac{2x+7}{x^2-1} = 1 \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow 2x+7 = x^2-1 \Leftrightarrow x^2-2x-8=0 \Leftrightarrow x=4, x=-2 \end{aligned}$$

Svar: $x = 4$ eller $x = -2$.

18. $2x^2 - 4x + 3y^2 + 18y = -23 \Leftrightarrow 2(x^2 - 2x) + 3(y^2 + 6y) = -23$

Kvadratkomplettering ger

$$2((x-1)^2 - 1^2) + 3((y+3)^2 - 3^2) = -23 \Leftrightarrow 2(x-1)^2 - 2 + 3(y+3)^2 - 27 = -23 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{2(x-1)^2}{6} + \frac{3(y+3)^2}{6} = 1 \Leftrightarrow \frac{(x-1)^2}{3} + \frac{(y+3)^2}{2} = 1.$$

Svar: En ellips med medelpunkten $(1, -3)$ och halvaxlarna $a = \sqrt{2}$ och $b = \sqrt{3}$.

19. $3z - i\bar{z} = 7 - 5i$

Med $z = x + iy$ och därmed $\bar{z} = x - iy$ får vi

$$3(x + iy) - i(x - iy) = 7 - 5i \Leftrightarrow 3x + 3iy - ix + i^2 y = 7 - 5i \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow 3x - y + i(-x + 3y) = 7 - 5i$$

Jämförelse av realdel och imaginär del ger ekvationssystemet:

$$\begin{cases} 3x - y = 7 \\ -x + 3y = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$$

Svar: $z = x + iy = 2 - i$.

20. $\frac{2x^2 - 4}{x+2} \geq x - 1 \Leftrightarrow \frac{2x^2 - 4}{x+2} - (x-1) \geq 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - x - 2}{x+2} \geq 0.$

Vi faktoruppdeler täljaren: $x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2, x = -1$. Vi får $\frac{(x-2) \cdot (x+1)}{x+2} \geq 0$

Sätt $f(x) = \frac{(x-2) \cdot (x+1)}{x+2} \geq 0$

Teckenschema

x		-2		-1		2	
$x-2$	-		-		-		+
$x+1$	-		-		+		+
$x+2$	-		+		+		+
$f(x)$	-	Odef.	+		-		+

Svar: $-2 < x \leq -1$ eller $x \geq 2$.